COLORADO
Department of Public Health & Environment

На страже здоровья и окружающей среды, на благо жителей штата Колорадо

Январь 2016 г. **Russian – Child Care & Preschool**

Уважаемые родители детей, посещающих дошкольные учреждения и подготовительные классы в штате Колорадо (2016-2017 уч. год),

Иммунизация является важным аспектом здоровья наших детей и общества в целом. Закон штата Колорадо требует, чтобы дети, посещающие лицензированные дошкольные учреждения и подготовительные классы, получили прививки от заболеваний, предупреждаемых вакцинацией. Целью этого письма является напомнить родителям о необходимости иммунизации при возвращении в школу и предоставлении информации об иммунизации. В Таблице на стр. 2 представлены прививки, **обязательные** для посещения школы, а также **рекомендуемые** прививки, обеспечивающие лучшую защищенность от заболеваний, предупреждаемых вакцинацией. Изменений в обязательных прививках с прошлого года не внесено. Рекомендуем показать это письмо врачу вашего ребенка или представителю местного учреждения здравоохранения (LPHA), где проводится вакцинация вашего ребенка.

В Колорадо используется график вакцинации, утвержденный Центрами по профилактике и контролю заболеваемости (CDC) и Консультативным комитетом по практике вакцинации. Этот график утвержден Американской академией педиатрии, Американской академией семейной медицины и Американской коллегией акушеров-гинекологов. Он обеспечивает наилучшую защиту детей от заболеваний, предупреждаемых вакцинацией, и является национальным стандартом для медицинских работников при назначении прививок.

С **1 июля 2016 г.**, родители и опекуны, желающие освободить своих детей от вакцинации по причинам, не связанным со здоровьем (по религиозным или личным убеждениям) с подготовительного по 12 класс, должны будут представлять форму освобождения по причинам, не связанным со здоровьем, на каждом возрастном этапе обязательной вакцинации: в возрасте 2 мес., 4 мес., 6 мес., 12 мес. and 18 мес. Формы освобождения по медицинским причинам представляются только один раз и должны быть завизированы подписью наблюдающего ребенка врача или медсестрой высшей квалификации. Для подачи требований об освобождении по медицинским и причинам, не связанным со здоровьем, перейдите на сайт: www.colorado.gov/vaccineexemption и следуйте приведенным инструкциям. Во время вспышек заболеваний, дети, освобожденные от вакцинации могут быть отстранены от дошкольных учреждений или подготовительных классов.

Когда речь идет о детских прививках и обеспечении безопасности вакцинаций, родители часто задаются вопросами и выражают желание получить дополнительную информацию. Материалы для родителей, касающиеся значения и безопасности прививок, размещены на сайте: www.ImmunizeForGood.com и www.colorado.gov/cdphe/immunization-education.

Закон штата Колорадо требует от дошкольных учреждений и подготовительных классов предоставления сведений об иммунизации и освобождений от вакцинации на общешкольном уровне в Министерство общественного здравоохранения и окружающей среды штата Колорадо (CDPHE) не позднее 1 декабря 2016 г. Показатели иммунизации и освобождений для большинства дошкольных учреждений и подготовительных классов будут размещены на сайте CDPHE сразу же после их подтверждения. Многие родители, в особенности если их детям противопоказаны прививки по состоянию здоровья, хотят знать, какие школы лучше всего защищены от заболеваний, предупреждаемых вакцинацией.

Поговорите с врачом или представителем местного учреждения здравоохранения (LPHA) и приносите в школу обновленные сведения об иммунизации вашего ребенка каждый раз, когда вашему ребенку делается прививка. Для получения контактной информации местного отдела общественного здравоохранения (LPHA) обращайтесь в группу охраны здоровья семьи по телефону 1-303-692-2229 или 1-800-688-7777. **С вопросами относительно школьных требований к вакцинации обращайтесь в вашу школу.**

С уважением,

Джеми Д'Амико, RN, MSN, CNS
Отдел вакцинации CDPHE - координатор работы со школами и местными отделениями
303-692-2957 | jamie.damico@state.co.us
www.coloradoimmunizations.com

# Карта прививок для дошкольных учреждений

## 2016-17 Карта обязательных прививок для д/с, дошкольных учреждений и поступления в подг. кл.

1. Данная карта является руководством, позволяющим лицам, осуществляющим уход за детьми, и родителям определить, какие прививки должен пройти ребенок для того, чтобы удовлетворить требованиям штата в отношении вакцинации. Выберите в левом столбце возрастной диапазон учащегося. В каждом столбце указано число доз, а названия вакцин приводятся в верхней строке. Сравнив с этой картой информацию, содержащуюся в справке о полученных прививках, убедитесь, что ребенок как минимум получил все дозы указанных вакцин. Совет здравоохранения штата Колорадо принял график иммунизации, разработанный Консультативным комитетом по практике вакцинации (ACIP) в отношении прививок, являющихся уже «обязательными» для посещения. К прививкам, не являющимся обязательными, но рекомендуемым, относятся: Прививки от ротавируса, гепатита А и гриппа.
2. Следуйте конкретным указаниям в отношении рекомендованного ACIP графика иммунизации: www.coloradoimmunizations.com, и щелкните на разделе «График иммунизации».
3. Если учащийся не получил минимально необходимо количества доз, родителям или опекунам будет направлено прямое уведомление (личное, по телефону или по почте) о том, что статус вакцинации ребенка не соответствует обязательному минимуму. В течение 14 дней после прямого уведомления родитель или опекун обязан обеспечить вакцинацию ребенка или предъявить документ о плане ее прохождения.
4. Закон штата Колорадо допускает представление освобождения по состоянию здоровья, подписанного лечащим врачом или освобождения по религиозным или личным убеждениям, подписанного родителем или опекуном.

| **Возраст ребенка** | Кол-во обязательных доз **DT, DTP или DTaP** *Дифтерит, Столбняк Коклюш Коклюш* | Кол-во обязательных доз **IPV** *Полиомиелит* | Кол-во обязательных доз **MMR** *Корь, свинка и краснуха* | Кол-во обязательных доз **Hib** *Haemophilus influenzae* тип b | Кол-во обязательных доз **Hep B** *Гепатит Б* | Кол-во обязательных доз **Varicella** *Ветрянка* | *Кол-во обязательных доз* **PCV13** *Пневмококковая инфекция* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **к 1 мес.** | - | - | - | - | 1✍ | - | - |
| **к 3 мес.** | **1** | **1** | - | **1** | 2✍ | - | **1** |
| **к 5 мес.** | **2** | **2** | - | **2** | 2✍ | - | **2** |
| **к 7 мес.** | **3** | **2** | - | **3/2♥** | 2✍ | - | **3/2~** |
| **к 16 мес.** | **3** | **2** | **1+** | **4/3/2/1♥** | 2✍ | **1*** | **4/3/2~** |
| **к 19 мес.** | **4** | **3** | **1** | **4/3/2/1♥** | 3✍ | **1** | **4/3/2~** |
| **к 2 годам** | **4** | **3** | **1** | **4/3/2/1♥** | 3✍ | **1** | **4/3/2/1~** |
| **К подг. кл.** | **5/4♦** | **4/3♣** | **2** | | 3✍ | **2** | - |

♦ Пять доз вакцины DTaP обязательны для записи в подготовительный класс школ Колорадо, если только 4-я доза не была введена в возрасте четырех лет или старше. В этом случае требуются только четыре дозы. Между введением 1-й и 2-й дозы должно пройти минимум четыре недели, между введением 2-й и 3-й дозы минимум четыре недели, между введением 3-й и 4-й дозы минимум четыре месяца, между введением 4-й и 5-й дозы минимум шесть месяцев. Последняя доза должна быть введена в возрасте не моложе четырех лет (4-я доза может быть введена в возрасте одного года при условии, что между 3-й и 4-й дозой прошло минимум четыре месяца).

♣ Четыре дозы вакцины полиомиелита должны быть получены до поступления в школу. Между введением 1-й и 2-й дозы должно пройти минимум четыре недели, между введением 2-й и 3-й дозы минимум четыре недели и между введением 3-й и 4-й дозы минимум шесть месяцев. Последняя доза должна быть получена в возрасте не младше четырех лет. 4-я доза не является обязательной, если 3-я была введена в возрасте четырех лет или старше и минимум через шесть месяцев после 2-й дозы.

\+ Первая доза MMR, введенная более чем за четыре дня до первого дня рождения, в качестве 1-й дозы не является действительной и не засчитывается. ACIP рекомендует введение 1-й дозы MMR в возрасте 12-15 месяцев. Учащийся считается не соответствующим требованиям при отсутствии записей о вакцинации MMR в возрасте16 месяцев.

♥ Количество обязательных доз Hib зависит от текущего возраста ребенка и от возраста получения первой вакцины Hib. Если доза вакцины была введена в возрасте 15 месяцев или позднее, требование по вакцинации Hib можно считать выполненным. Детям, начавшим получать серию вакцин в возрасте до одного года, необходимо ввести три дозы, из которых минимум одна должна быть введена в 12 месяцев или в более старшем возрасте. Если 1-я доза была введена между 12 и 14 месяцами, требуются две дозы. Если текущий возраст ребенка 5 лет или старше, новые или дополнительные дозы не требуются. Количество доз и интервалы могут варьировать в зависимости от типа вакцины Hib.

✍ Вакцины от гепатита Б является единственной прививкой, которая может быть сделана при рождении. Вторая доза вакцины гепатита Б должна быть введена минимум через четыре недели после 1-й дозы, 3-я доза минимум через 16 недель (4 месяца) после 1-й дозы, а последняя минимум через 8 недель после 2-й дозы и в возрасте почти шести месяцев (24 нед.) или старше.

* Если ребенок переболел ветрянкой и это отражено во врачебных записях, считается, что он удовлетворяет требованиям вакцинации. Первая доза вакцины от ветрянки, введенная более чем за четыре дня до первого дня рождения, в качестве 1-й дозы не является действительной и не засчитывается. ACIP рекомендует введение 1-й дозы в возрасте 12-15 месяцев. Учащийся считается не соответствующим требованиям при отсутствии записей о введении 1-й дозы в возрасте16 месяцев.

~ Количество доз вакцины PCV13 зависит от текущего возраста ребенка и возраста введения первой дозы. Если 1-я доза вводится в возрасте 7-11 мес., учащийся должен получить 3 дозы (2, 4 и 6 мес.) с интервалом не менее 4-8 недель и дополнительную дозу в возрасте между 12 и 15 месяцами, с интервалом не менее 8 недель после введения последней дозы. Если 1-я доза вводится между 7 и 11 месяцами, учащийся должен получить две дозы не менее чем через два месяца и дополнительную дозу в возрасте между 12 и 15 месяцами. Если 1-я доза была введена между 12 и 23 месяцами, требуются две дозы с интервалом не менее двух месяцев между их введением. Если вакцина PCV вводилась в возрасте между 2 и 4 годами, требование по ней можно считать выполненным. В возрасте старше 5 лет вакцинация не требуется.