


Directrices provisionales para la evaluación y las pruebas de bebés cuyas madres viajaron a un área con transmisión actual del virus del Zika* o vivieron en un área afectada durante el embarazo^{†§}



*El sitio web de los CDC <http://wwwnc.cdc.gov/travel/notices> muestra las áreas con transmisión del virus del Zika.

[†]Se define microcefalia como la circunferencia occipitofrontal inferior al tercer percentilo para la edad gestacional y el sexo según las curvas de crecimiento estándar, que no tiene explicación en otras etiologías.

[§]La evidencia de laboratorio de la infección por el virus del Zika incluye 1) el virus del Zika detectable, el ARN del virus del Zika o el antígeno del virus del Zika en algún espécimen clínico, o 2) positivo en Inmunoglobulina M (IgM) del virus del Zika con valores de anticuerpos neutralizantes que confirmen ser más de 4 veces superiores al valor de anticuerpos neutralizantes del virus del dengue en suero o un líquido cefalorraquídeo. Las pruebas no son concluyentes si los valores de anticuerpos neutralizantes con titulación de virus del Zika son inferiores a 4 veces los valores de anticuerpos neutralizantes del virus del dengue.

Puede encontrar más información sobre las pruebas de laboratorio para la infección por el virus del Zika en <http://www.cdc.gov/zika/state-labs/index.html>.

