

**PERMISO DE IMPLANTE DE NEXPLANON / IMPLANON / HOJA DE INFORMACIÓN DEL CLIENTE**

Comprendo que el Nexplanon/Implanon es un tipo de implante anticonceptivo que consiste en una barra flexible pequeña, que contiene una forma de la hormona progestina. Será implantado debajo de la piel de la parte superior de mi brazo. Entiendo que Nexplanon/Implanon evitará que quede embarazada durante hasta 3 años. Después de tres años, Nexplanon/Implanon ya no es eficaz y deberá sacarse. Puedo tener otro inserto Nexplanon/Implanon a la vez o comenzar a usar otro método anticonceptivo. Asimismo, sé que puedo sacarme el Implanon/Implanon en cualquier momento y por cualquier razón.

Comprendo que Nexplanon/Implanon es más eficaz para prevenir embarazos que la píldora. El Nexplanon/Implanon no es permanente. Una vez que me lo saque, puedo quedar embarazada. Comprendo que el Nexplanon/Implanon podría no ser tan eficaz si tomo determinados medicamentos (principalmente medicamentos contra convulsiones) o el remedio en base a hierbas llamado St. John's Wort.

Sé que las mujeres que usan Nexplanon/Implanon sufren cambios en el período menstrual. Algunas mujeres tienen manchado o sangrado más frecuentes y otras sangran menos o no tienen sangrado. Es normal que se produzcan manchados entre los períodos. Comprendo que algunas mujeres también pueden aumentar de peso y sufrir dolores de cabeza o depresión. Asimismo, comprendo que Nexplanon/Implanon no me protege contra enfermedades de transmisión sexual, incluyendo el virus que causa el VIH. Necesito usar condones para ayudar a protegerme contra infecciones.

Se me ha informado qué sucederá cuando me coloquen y retiren el Nexplanon/Implanon. Sé que podría sentir algún tipo de incomodidad durante y después de estos procedimientos. Me han informado acerca de los problemas que podrían ocurrir al colocar o retirar el Nexplanon/Implanon, tales como: reacción alérgica a la anestesia; moretones o dolor alrededor del sitio de colocación; o infección. Si bien es raro que suceda, después de que se coloca el Nexplanon/Implanon, podría salirse accidentalmente. El Nexplanon/Implanon puede romperse al retirarlo.

Retirar el Implanon/Implanon puede ser un poco más difícil que colocarlo. Algunas veces es necesario dos consultas con el médico antes de que se pueda quitar la barra de Nexplanon/Implanon.

Tengo una copia de información del paciente por escrito que incluye más detalles sobre este y otros riesgos/efectos secundarios.

**Sé que debo llamar a la clínica si:**

- Quiero sacarme el Nexplanon/Implanon ;
- Tengo sangrado vaginal abundante color rojo brillante en mayor cantidad que un período;
- Tengo un período tardío después de haber tenido los períodos a tiempo;
- Tengo dolor, pus, sangrado o piel roja donde se colocó el Implanon/Implanon, o si la cápsula de Nexplanon/Implanon se sale;
- Tengo mucho dolor en la parte inferior del estómago o abdomen;
- Tengo fuertes dolores de cabeza o problemas de visión.

**Me han presentado la información anterior en forma oral y escrita. Entiendo la información y mis preguntas han sido evacuadas.**

**A mi leal saber y entender de la información anterior, autorizo a que me inserten Nexplanon / Implanon.**

Firma del cliente \_\_\_\_\_ Fecha \_\_\_\_\_

Firma del proveedor \_\_\_\_\_ Fecha \_\_\_\_\_

Información de identificación del intérprete \_\_\_\_\_