

POR FAVOR LEA DETENIDAMENTE

**Indicaciones para tomar el medicamento para la clamidia
(Aзитromicina 1 gramo) Otros nombres: Zithromax**

Su pareja sexual se trató recientemente para detectar la clamidia, una infección que contrae al tener relaciones sexuales con una persona que ya está infectada. Muchas personas con clamidia no saben que la tienen debido a que sienten bien.

Usted podría tener clamidia. Es importante que usted reciba tratamiento. Queremos asegurarnos que reciba el medicamento que necesita tan pronto como sea posible. La mejor manera de cuidar de sí mismo es consultar a un médico o ir a la clínica de planificación familiar _____ para un realizarse un control y obtener medicamentos.

Si usted no es capaz de ir a su proveedor de atención médica o a la clínica pronto, usted puede tomar el medicamento para detectar la clamidia adjuntado en este paquete. Es importante destacar que las personas que han tenido clamidia y que ya han sido tratadas pueden contraer esta enfermedad de nuevo si tienen contacto sexual con personas infectadas con clamidia. Si los síntomas de una persona aún continúan, incluso después de recibir tratamiento, él o ella debe regresar a un médico para ser revisado(a) nuevamente.

SI USTED ES UNA MUJER Y TIENE SÍNTOMAS DE DOLOR PÉLVICO O ABDOMINAL, USTED DEBE VISITAR AL MÉDICO PARA ASEGURARSE DE NO TENER LA ENFERMEDAD PÉLVICA INFLAMATORIA (EPI). LA EPI PUEDE SER GRAVE Y LLEVAR A LA INFERTILIDAD, PROBLEMAS CON EL EMBARAZO O DOLOR PÉLVICO CRÓNICO.

¡ANTES DE TOMAR ESTE MEDICAMENTO, POR FAVOR LEA ESTAS INSTRUCCIONES!

El uso de este medicamento es seguro. Pero usted no deberá tomarlo si alguna vez tuvo una reacción alérgica (como una erupción cutánea o problemas respiratorios) a cualquiera de los siguientes medicamentos: Azitromicina, Zithromax, Eritromicina, E-Mycin, Ery-Tab, E.E.S., claritromicina o Biaxin. Si usted no sabe si es alérgico, llame a un proveedor de atención médica o farmacéutico antes de tomar este medicamento.

No es común presentar reacciones a la azitromicina. Pero si usted tiene alguno de los siguientes síntomas después de tomar el medicamento, llame a su proveedor de atención médica o busque tratamiento médico de emergencia inmediatamente: erupción; urticaria; picazón; silbidos en el pecho o dificultad para respirar o tragar; inflamación de la cara, garganta o lengua; dificultad para respirar; latidos cardíacos rápidos o irregulares; mareos severos; desmayos; diarrea grave; coloración amarillenta en la piel u ojos; o cualquier otro problema inusual.

Usted debe hablar con su proveedor de atención médica antes de tomar este medicamento si padece una enfermedad grave, a largo plazo, como enfermedad renal, hepática o cardíaca; insuficiencia cardíaca, trastorno del ritmo cardíaco o prolongación del QT; está tomando medicamentos para el corazón, miastenia grave, colitis o problemas del estómago.

Si usted está tomando otro medicamento, hable con su proveedor de atención médica antes de tomar azitromicina. Algunos medicamentos no se mezclan bien con la azitromicina.

Tome los medicamentos de acuerdo a las indicaciones. Usted puede tomar azitromicina con o sin alimentos.

No tome un antiácido al mismo tiempo que toma azitromicina. Tome las antiácido 2 horas antes o 4 horas después de tomar azitromicina.

No comparta este medicamento ni se lo dé a nadie más.

Si tiene alguna pregunta acerca de la clamidia, sobre este medicamento, sobre nuestro horario de atención en la clínica o programar una cita en la clínica de planificación familiar _____, por favor llame al _____.